

Campania, vaccinazioni pediatriche: oltre il 90% ma i richiami sono al palo

IL REPORT

Coperture vaccinali dell'età pediatrica e dell'adolescente: sono stabili, lungo lo Stivale, i dati della profilassi aggiornati al 31 dicembre del 2024 resi disponibili dal ministero della Salute. I numeri sono quelli relativi alle vaccinazioni in età pediatrica riferiti alle coorti del 2022, 2021 e 2020 (dunque epoca Covid di bambini oggi dai 2 ai 4 anni compiuti), e poi 2017 e 2016 (soggetti dunque a richiami in età prescolare calcolati al compimento del 7° anno e infine il recupero a 8 anni). Infine sotto la lente la situazione dei bambini nati nel 2008 e 2006 (rispettivamente per monitorare i richiami nell'adolescenza a 16 e 18 anni). I dati mostrano una buona copertura vaccinale nei bambini più piccoli, ma ci sono ancora sfide da affrontare, soprattutto per le vaccinazioni in età prescolare e adolescenziale in particolare in diverse regioni del Sud, Campania in testa. Le coperture vaccinali per bambini di 24 mesi per la Polio si attestano al 94,45% (sotto l'obiettivo del 95%), morbillo: 94,77% (sotto l'obiettivo del 95%) e varicella: 93,87%, (tra le obbligatorie) oltre che Meningococco B (79,44%) e anti-pneumococcica (90,05%) tra quelle consigliate. Le coperture vaccinali a 36 mesi (coorte 2021) rimandano invece a una adempienza per la Polio (95,15%), e in aumento rispetto all'anno precedente per il Morbillo e coperture vaccinali a 48 mesi (coorte 2020) superiore al 95% per la Polio e il Morbillo. Svendono come detto le coperture vaccinali in età prescolare (5-6 anni): fasi della vita in cui la vita di comunità più intensa richiederebbero una più efficace copertura. In questa fascia di età la quarta dose di anti-polio si attesta me-

diamente all'84-86%, la seconda dose di anti-morbillo all'84-86%. Infine le coperture vaccinali nell'adolescenza per i sedicenni (coorte 2008) è in calo per polio (65,62%) e rosolia (92,95%) e per i diciottenni (coorte 2006): in aumento per la copertura contro la difterite (76,69%). Un quadro in cui si evidenziano significative differenze regionali: 11 Regioni superano il 95% di copertura per la Polio a 24 mesi (Piemonte, Lombardia, P.A. di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, e Basilicata) con la Campania che con 93,42 arretra rispetto all'obiettivo. Le altre Regioni hanno invece coperture comprese tra il 90% e il 95%, ad eccezione della P.A. di Bolzano e della Sicilia che registrano coperture rispettivamente dell'87,11% e 85,13%. Infine la copertura vaccinale per Morbillo a 24 mesi mostra un intervallo dal 87,98% della Sicilia al 98,11% del Molise. Importanti differenze regionali si osservano anche nelle età prescolari e negli adolescenti con un gradiente Nord e Centro Sud che in queste fasce di età è più sensibile nel Lazio, in Campania, Abruzzo e Sicilia e la P.A. di Bolzano tutte con coperture inferiori al 90%.

VACCINO ANTINFLUENZALE

«Come pediatri siamo impegnati a garantire oltre che la somministrazione a che la formazione dei genitori sulle vaccinazioni – riflette Antonio D'Avino, napoletano presidente nazionale della Fimp, Federazione italiana medici pediatri – anche per la vaccinazione antinfluenzale lanciamo un appello ai genitori in previsione di un picco molto pericoloso per i pazienti fragili atteso in queste feste. Nell'ambito della campagna vaccinale già in corso, la somministrazione è stata estesa gratuitamente a tutti i bambini sani nella fascia

d'età tra i 6 mesi e i 6 anni, considerati categoria a rischio e principale veicolo di diffusione». Secondo le previsioni citate dai pediatri, basate sull'osservazione della stagione australe, l'influenza di quest'anno potrebbe essere più intensa, con virus capaci di eludere parzialmente la risposta immunitaria. Si ipotizza un picco di contagi tra gennaio e febbraio, che potrebbe raggiungere fino a 20 milioni di casi nel Paese. La Fimp sottolinea come la fascia d'età 0-4 anni sia tra le più colpite, poiché il sistema immunitario dei bambini più piccoli è meno pronto ad affrontare il virus. L'invito a vaccinare, ha spiegato, è esteso non solo ai bambini con patologie croniche ma anche a quelli sani, in particolare se frequentanti asili nido o scuole dell'infanzia, poiché questa fascia d'età «rappresenta il serbatoio naturale dell'infezione». Il vaccino contro l'influenza disponibile per la fascia dai 6 mesi ai 2 anni non compiuti è a base di virus inattivato e di somministra per via iniettiva. Dai 2 anni ai 18 anni è disponibile anche un vaccino a virus vivi attenuati, somministrato tramite spray nasale con poche o nulle controindicazioni.

e.mau.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DATI DEL MINISTERO DELLA SALUTE: PER POLIO E MORBILLO ITALIA NELLA MEDIA EUROPEA MA SOTTO IL TARGET DELL'OMS



Peso: 27%



PREVENZIONE Morbillo e polio, dati delle vaccinazioni in età pediatrica oltre il 90% mentre la soglia stabilita dell'Oms è del 95%



Peso: 27%